

MÉTODOS MATEMÁTICOS IV, curso 2008/2009

Convocatoria extraordinaria de diciembre (17 de diciembre de 2009)

- ♣ Hacer constar en cada hoja el nombre y DNI del alumno.
 - ♣ Cada pregunta debe responderse en hoja aparte. La puntuación máxima de cada pregunta se indica entre corchetes.
 - ♣ Tiempo: **4 horas**.
-

[1.7] 1) Sea la curva que surge de la intersección del cono $z^2 = (x - 1)^2 + y^2$ y el cilindro parabólico $z^2 = 1 - x$.

- a) Demuestra que esta curva es la misma que resulta de la intersección de una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y un cilindro $x^2 + y^2 = x$. (Se la conoce como *bóveda de Viviani* y fue obtenida por el florentino Vincenzo Viviani, discípulo de Galileo, en 1692.)
- b) Representa gráficamente la curva. [*Sugerencia: utilizar la información del apartado anterior.*]
- c) Encuentra una parametrización regular de la curva y calcula la curvatura. ¿En qué puntos es máxima? [*Sugerencia: no llevar la curva a su parametrización natural.*]

[1.6] 2) Sea $U \subset \mathbb{R}^3$ la región sólida limitada por el hiperboloide de una hoja $x^2 + z^2 = 1 + y^2$ y los planos $y = -1$, $y = 1$ y $z = 0$, con $z \geq 0$.

- a) Dibujar U y orientar su frontera para que cumpla el teorema de Gauss.
- b) Comprobar que se cumple el teorema de Gauss en U para el campo vectorial

$$\vec{F} = x \mathbf{e}_1 + f(x, z) \mathbf{e}_2 + g(x, y) \mathbf{e}_3 ,$$

donde $f(x, z)$ y $g(x, y)$ son funciones arbitrarias de clase $C^{k \geq 1}(U)$.

[1.5] 3) a) Escribir la ecuación diferencial

$$x^2 y'' + xy' - \lambda y = 0, \quad y'(1) = y(e) = 0,$$

en la forma de Sturm-Liouville. b) Obtener los autovalores y autofunciones, y comprobar que las autofunciones cumplen la propiedad de ortogonalidad.

[1.5] 4) a) Obtener la solución general de la ecuación diferencial

$$3xy'' + 2y' + y = 0$$

mediante el método de Frobenius. b) Calcular el radio de convergencia de las series funcionales resultantes.

[*Nota: No es necesario deducir la forma explícita de los coeficientes de las series, basta con las relaciones de recurrencia que satisfacen.*]

[1.2] 5) a) A partir de la funcional generatriz

$$e^{\frac{1}{2}x(z-\frac{1}{z})} = \sum_{n \in \mathbf{Z}} z^n J_n(x),$$

obtener la expresión de las funciones de Bessel $J_n(x)$ como series de potencias.

b) Comprobar que las expresiones resultantes cumplen la ecuación

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = 0,$$

y deducir la relación existente entre $J_n(x)$ y $J_{-n}(x)$.

[Sugerencias: Desarrollar en serie las exponenciales $e^{\frac{1}{2}xz}$ y $e^{-\frac{1}{2}\frac{x}{z}}$, y distinguir claramente los casos $n \geq 0$ y $n < 0$.]

[1] 6) Considérese la ecuación diferencial en derivadas parciales:

$$u_{xx} + 3u_{tt} - 4u_{xt} = 0$$

donde $-\infty < x < \infty$, $t > 0$.

a) De que tipo (parabólica, hiperbólica o elíptica) es la ecuación?

b) Mediante el cambio de variable $\alpha = 3x + t$, $\beta = x + t$, expresa dicha ecuación en su forma canónica.

c) Encuentra la solución de esta ecuación para las condiciones iniciales:

$$u(x, 0) = x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

[1.5] 7) Utilizando el método de separación de variables, resuelve la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u(r, \theta) = 0$$

en un cuarto de disco de radio unidad, esto es, donde $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, y con las condiciones de frontera

$$u(0, \theta) \text{ no divergente}, \quad u(1, \theta) = \sin 6\theta, \quad u(r, 0) = 0, \quad u(r, \frac{\pi}{2}) = 0.$$

NOTA: Laplaciano ∇^2 en coordenadas polares:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$